

**Склад:** 1 капсула містить: *основна речовина:* цинку гліцинат - 90,3 мг (мг) (відповідає 25 мг (мг) елементарного цинку); *допоміжні речовини:* целюлоза мікрокристалічна, лактоза, кальцію стеарат, кремнію діоксид.

**ЦИНК є одним із найважливіших мікроелементів**, який входить до складу більш ніж 300 металоферментів, важливих для структурних, сигнальних і регуляторних процесів багатьох систем і органів.

**Цинк важливий для:**

- синтезу організмом нуклеїнових кислот, амінокислот, білків, клітинних мембран, специфічних гормонів (таких як інсулін, кортикостероїди, тестостерон);
- метаболізму жирних кислот, збереження нормального рівня вітаміну А в крові;
- формування повноцінної і адекватної імунної відповіді організму;
- антиоксидантного захисту клітин;
- підтримки здоров'я кісток, шкіри, волосся, нігтів;
- підтримки нормального функціонування мозку: покращує пам'ять, розумову працездатність;
- підтримки якості зору.

**Дефіцит цинку може впливати на:**

- зниження імунітету (підвищена схильність до гострих респіраторних захворювань та зростання частоти розвитку діареї);
- порушення вуглеводного балансу, гіперхолестеринемію, гіпертензію;
- зниження концентрації уваги та пам'яті;
- зниження апетиту;
- розвиток дерматологічних захворювань (сенильну алопецію, вогнищеву алопецію, акне, ексфоліативний дерматит, псоріаз);
- швидкість загоєння ран та ушкоджень шкіри;
- якість зору (прояви нічної сліпоты та розвиток макулярної дегенерації);
- психічні та мозкові розлади;
- розвиток гіпертрофії простати.

Окрім того, **до груп ризику** порушення процесів всмоктування, засвоєння чи підвищеної втрати цього мікроелемента організмом, **відносять осіб з наступними станами:** цукровий діабет; цироз печінки; захворювання кишечника (целиакія, хвороба Крона, стеаторея, виразковий коліт), синдром короткої кишки, тривала діарея; перенесені операції з резекції шлунку; прояви генетичних патологій (синдром Дауна, акродерматит ентеропатичний, серпоподібноклітинна анемія, таласемія); захворювання нирок (нефротичний синдром, ниркова недостатність), гемодіаліз; хронічні інфекції, спричинені зниженням активності імунного захисту; паразитарні інвазії кишечника; захворювання підшлункової залози; тривалий стрес і надмірне фізичне навантаження, перенесені травми; алкоголізм, анорексія, булімія, опіки та ін.

Також дефіцит цинку може бути спричинений дієтою з низьким вмістом цинку. При цьому засвоєння цинку може погіршуватись у випадку присутності у раціоні харчування великої кількості продуктів, що



Якщо Вам або Вашим близьким **необхідно часто або тривалий час приймати** цей або інші саплементи дієти, пропонуємо Вам приєднатись до **Клубу споживачів OMNICALUB.**

**ЗРУЧНІСТЬ & ЕКОНОМІЯ**

містять фітинову кислоту (каші, висівки, насіння, горіхи, бобові та продукти, багаті на клітковину), великих доз конкуруючих за сорбцію у кишківнику мікроелементів (кальцій, залізо).

#### **Рекомендації щодо застосування:**

ЦИНФОРТ містить цинку гліцинат, сполуку цинку та амінокислоти гліцину, і рекомендується в якості добавки дієтичної до раціону харчування як додаткове джерело цинку з метою корекції його дефіциту в організмі. Застосування цинку саме у формі гліцинату у складі забезпечує краще засвоєння цинку в кишечнику. При цьому таке покращення має місце навіть за наявності речовин, які погіршують всмоктування цинку, а також при станах, коли засвоєння цинку порушене.

#### **Спосіб застосування та рекомендована добова доза:**

Вживати дорослим по 1 капсулі на добу. За рекомендацією лікаря доза може бути збільшена для дорослих до 2 капсул на добу.

Базова тривалість курсу вживання складає не менше 20 днів. В окремих випадках індивідуальна тривалість курсу може бути збільшена лікарем.

Для кращого засвоєння цинку бажано приймати ЦИНФОРТ за 1 годину до їди або через 2 години після споживання їжі. При виникненні неприємного відчуття подразнення шлунково-кишкового тракту ЦИНФОРТ слід приймати безпосередньо до або протягом споживання їжі.

**У періоди активного розповсюдження гострих респіраторних вірусних інфекцій з метою профілактики та для сприяння попередженню ускладнень курс прийому краще повторювати 2 місяці поспіль з перервою на 10 днів. У цей же період доцільно поєднувати прийом ЦИНФОРТ та добавки дієтичної ДЕКАП® (таблетки вітаміну D3, що містять 2000 або 5000 МО холекальциферолу).**

**Застереження щодо застосування:** • Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. • Слід уникати одночасного вживання добавки дієтичної ЦИНФОРТ та комплексних вітамінних препаратів, які містять цинк. • Не перевищувати рекомендованої добової дози! • Перевищення рекомендованого добового дозування цинку може спричинити дефіцит міді. • Передозування цинку може спричинити нудоту, блювання, гіпотонію (запаморочення), втрату апетиту, спазми в животі, біль у ротовій порожнині та горлі, діарею та головний біль. У випадку названих симптомів слід звернутись до лікаря!

**Протипоказання:** індивідуальна непереносимість компонентів, вагітність, період годування груддю; непереносимість галактози або фруктози, дефіцит лактази, синдром мальабсорбції галактози.

**Форма випуску:** капсули №20, №30, №40, №50, №60, №90, по 10 капсул у блістері, в картонній пачці.

**Маса нетто 1 капсули:** 320 mg (mg) ± 5%.

**Строк придатності:** 2 роки.

**Умови зберігання:** зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°C, в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.

**Виробник:** ТОВ «ОМНІФАРМА КИЇВ», Україна, 02088, м. Київ,

вул. Євгенія Харченка, буд. 55, тел.: + 38 044 377-51-14;

фактична адреса потужностей (об'єкта) виробництва:

Україна, 20741, Черкаська обл., Смілянський район, с. Сунки, вул. Центральна, 1.

ТУ У 10.8-35758392-016:2020

OMNIFARMA

#### **ЗРУЧНІСТЬ ТА ЕКОНОМІЯ:**

- ✓ спеціальні ціни на економ-упаковки продукції,
- ✓ безкоштовна доставка до Вашого міста,
- ✓ інші корисні сервіси та вигідні пропозиції.

**Детальні умови участі у Клубі OMNICLUB та реєстрація:**

[vipclub.omnifarma.com.ua](http://vipclub.omnifarma.com.ua)

Скануйте QR-код, щоб  
дізнатись більше

